

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 22.09.2023/12877

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



GIBBROVAP

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

Grup	-	BGD (BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ)
------	---	-----------------------------------

20 g/l Gibberellic acid(GA3)

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyat :
İçindekiler: Gibberellic acid

Ek-2

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DÖNEMLERİ:

Bitki	Kullanma Amacı ve Dönemi	Uygulama Dozu (100L suya)
Sofralık Çekrdeksiz Üzümler	1.Uygulama: Çiçeklenmeden önce, somaklar henüz 4-8 cm boyda iken sıklıkların boyunu uzatmak için kullanılır. 2.Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının (çiçek kapsülü) %70-80' i döküldüğü devrede tane seyraltmek için kullanılır. 3.Uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm çap iriliğine ulaştığında tane irileştirmek için kullanılır.	100 ml
Kurutmalık üzümler	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra uygulama yapılır.	50 ml
Mandarin	Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacıyla çiçeklerin %75-80' nin açtığı devrede kullanılır.	75 ml
Portakal	Yaşa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington navel de meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	100 ml
Limon	Meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrelerde meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme bozunma yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacıyla meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin %30 açtığı devrede verim artırmak için ve çiçeklenme devresinde meydana gelebilecek don zararından korunmak için donlardan en geç 2 gün sonra hazırlanan solüsyon ağaçlara püskürtülür.	75-100 ml 25-100 ml
Kiraz, Vişne ve Şeftali	Hasadı geciktirmek iri ve parlak taneleri elde etmek amacıyla renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak uygulama bir sonraki yılın çiçek açılımını 3-7 gün geciktirir ve şeftalinin ilk baharın geç donlarından zarar görmesini engeller.	75 ml
Çilek	Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasının temini için anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsüle yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için ise çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.	75-125 ml
Enginar	Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacıyla bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısımlarına uygulanır.	125-150 ml
Patates	Tohumluk olarak kullanılacak patatesler, dikiminden önce hazırlanan solüsyona dikimden önce daldırılarak muamele edilir ve dikilir. Böylece çimlenme hızlanır ve düzenli çıkış olur.	25-50 ml

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik vb.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkarın, solunum desteği gerekli olabilir.

Gerekirse tıbbi destek alınız.

Cilt Teması Sonrası: Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve ilaç değen vucut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın. **(Bakınız Önlem İfadeleri P302 + P352:)**

Göz Teması Halinde: Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz. **(Bakınız Önlem İfadeleri P305 + P351+ 338:)**

Yutulması Halinde: Hastaya, tarım ilaçlarının seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olması halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Ürün etiketi ve bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. **(Bakınız Önlem İfadeleri P301 + P310:)**

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H304: Yutulması halinde toksiktir.

EUH401: insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P322: Özel önlemler (etikete bakın)

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: içeriği/kabı ... bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyeye dozunda fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

ŞİLAN YENİGÜL ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi

VAPCO
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM
VETERİNERLIK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Petik Plaza: 8A/63
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06
Faks: 0312 217 22 06 - Tic Sic: 398009

09 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 358

Dr. Nesrin ÇAKIRARICA
Daire Başkanı

Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce uygulama yapılır.	50-100 ml
Biber	Verimi artırma için, çiçeklerin yarısı, meyve tuttuğunda hazırlanan solüsyona ilk uygulama bundan 2-3 hafta sonra da ikinci uygulama yapılır.	150 ml
Süs Bitkileri	Türlere ve bitkilerin tiplerine göre değişmekle birlikte çiçekçilikte (karanfil,gül,glayöl,lisianthus,krizanten)uzun zap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır.	200-750 ml

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Yarıya kadar su doldurulmuş tanka önerilen miktar preparat ilave edilerek karıştırılır. Tank su ile tamamlandıktan sonra tekrar karıştırılarak mahsül hazır hale getirilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması tavsiye edilmez. Birkarışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



GIBBROVAP

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

Grup	-	BGD (BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ)
20 g/l Gibberellic acid(GA3)		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114



Şilan YENİGÜL ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi

VAPCO
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza: 8A/63
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06
Tic Sic. No: 2830440894 - Tic Sic: 398009

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:
17058, Amman-11195- JORDAN
Tel: 0096265694991, Faks: 0096265694998

ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

09 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 35/9