

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve No.su:

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol ettiği yabancı otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
ÇELTİK Çıkış sonrası	<i>Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)</i> <i>Çatalotu (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Yabani darı (Panicum spp)</i> <i>Darıcan (Echinochloa crus-galli)</i> <i>Baraj otu (Leptochloa fusca)</i>	70 ml/da	-
PAMUK Çıkış öncesi	<i>Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Semizotu (Portulaca oleracea)</i> <i>Demir diken (Tribulus terrestris)</i> <i>Çoban değneği (Polygonum aviculare)</i> <i>Bambul otu (Chrozophora tinctoria)</i> <i>Echinocloa</i> <i>Şeytan elması (Datura stramonium)</i> <i>Benekli darıcan (Echinocloa colonum)</i> <i>Yapışkan otu (Setaria verticillata)</i> <i>Kirpi darı (Setaria viridis)</i> <i>Sirken (Chenopodium album)</i> <i>Köpek Üzümü (Solanum nigrum)</i> <i>Horoz ibiği (Amaranthus albus)</i> <i>Darıcan (Echinochloa crus-galli)</i>	125 ml/da	-

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılacak. 20-40 lt/ dekar ilaç normunda yapılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



## CLOMAVAP

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grup	F4	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
		480 g/l Clomazone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
  - EVDE KULLANMAYINIZ.
  - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
  - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik vb.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ

**Soluma Sonrası:** Temiz havaya çıkarın, solunum desteği gerekli olabilir. Gerekirse tıbbi destek alın.

**Cilt Teması Sonrası:** Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve ilaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın.

**Göz Teması Halinde:** Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz. **(Bakınız Önlem İfadeleri : P305+P351+P338):**

**Yutulması Halinde:** Hastaya, tarım ilaçlarının seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olması halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Ürün etiketi ve bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktar:

Azami per. Satış fiyat :

**İçindekiler:** Clomazone



**UYARI KELİMESİ:** TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H336** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H410** Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P260** Gaz / duman / buhar / toz solumayın.
- P264** Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
- P280** Göz/yüz koruması kullanın.
- P310** Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P305 + P351 + P338** GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın. Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- P501** İçeriği/kabı ... bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyeye dozunda fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

VAPCO  
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. B250 Cad. Polat Plaza:3A/153  
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06  
Doğanbey V.D: 0830440894 - Tic Sic: 398009

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ZEHİR TİC. İL. 014  
ŞİŞLİ YENİGÜL ERDOĞAN  
Ziraat Mühendisi

11 Ağustos 2022

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



## CLOMAVAP

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Grup	F4	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	----	--------------------------------

480 g/l Clomazone

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114**

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

#### Çeltik :

#### Erken çıkış sonrası :

Çeltiğin 1-2 yapraklı olduğu erken çıkış sonrası dönemde suyu boşaltılmış tavalara havadan veya yerden uygulanabilir. İlaçlamadan sonra en geç 2-3 gün içerisinde tavaya en geç 3 gün sonra su dolumu yapılır.

**Pamukta çıkış öncesi:** Clomovaptan daha etkili bir sonuç almak için toprağın nemli olması mümkünse dikimden hemen sonra toprak nemliyken uygulanması önerilir. Clomovap toprak yüzeyinde film tabakası oluşturması için ilaçlama yapılırken kullanılacak su miktarının dekara 70- 80 litre olması önerilir. Clomovap kullanımından sonra minimum 20 gün toprak işleme yapılmamalıdır. Yağacak olan yağışlar ilacın etkisini dahada artırır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: CLOMAVAP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup **F4** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CLOMAVAP**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F4 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞILABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

Şİlan YENİGÜL ERDOĞAN  
Ziraat Mühendisi

11 Ağustos 2022

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

### ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:  
17058, Amman-11195- JORDAN

### ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63  
Çankaya / ANKARA  
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

VAPCO  
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza: 6A/63  
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06  
Duşanbey V.D.: 8830440694 - Tic Sic: 398000