

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 08.01.2020/11546

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
	Elma külemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60 g / 100 L su	
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monillinia laxa</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monillinia laxa</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Kiraz ve Vişne	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monillinia laxa</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Yeni Dünya	Yenidünya karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i> var. <i>Eriobotryae</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Ayva	Monilya(mumya) (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	60 g / 100 L su	14 gün
Hıyar Kavun*	Kabakgillerde küleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fulliginea</i>)	40 g / 100 L su	3 gün
Bağ**	Bağ külemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	100 g / 100 L su	14 gün
Şekerpancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	40 g / 100 L su	21 gün

*Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemektedir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan yerlerde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**VAPCOTOP**

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	B1:1	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------

%70 Thiophanate-methyl

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürününün uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığına riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalması, gözyaşı ve sümük artışı vb.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Kirlenen alanı hemen terk edin ve açık havaya çıkınız. Nefes almaması halinde suni solunum uygulayın. Nefes almakta zorlanması halinde oksijen verin. Semptomların olması halinde hastaneyi arayınız ve hastaneye gidiniz.

Cilt Teması Sonrası: Bulaşan kıyafetleri hemen çıkartın. Saçlar ve tırnakların altları dahil olmak üzere bol su ve sabun ile yıkayınız. Semptomların olması halinde hastaneyi arayınız ve etkilenen alanların tamamen yıkanmasının ardından hastayı hastaneye götürünüz.

Göz Teması Halinde: Gözleri en az 15 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.

Yutulması Halinde: Kusturmaya çalışmayınız. Hastanın bilincini kaybetmiş olması halinde suya etkinleştirici kömür atarak uygulama yapınız; ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz, hastanın hava yolunun açık olduğunda emin olunuz ve hastayı, başı vücudundan aşağıda olacak şekilde yatırınız. Hemen bir doktoru arayınız ve hastaneyi arayınız.

ANTİDÖT VE TEDAVİSİ: Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Thiophanate-methyl

ZARARLILIK İSARETLERİ:

**UYARI KELİMESİ: DİKKAT****ZARARLILIK İFADELERİ (H)****H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.**H332:** Solunması halinde zararlıdır.**H341:** Genetik hasara yol açma şüphesi var.**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.**ÖNLEM İFADELERİ (P)****P264:** Elleçlemeden sonra elleri ile iyice yıkayın.**P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.**P280:** Korumacı eldiven/korumacı kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.**P281:** Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.**P391:** Döküntüleri toplayınız.**P308+P313:** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.**P405:** Kilit altında saklayınız.**P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf ediniz.**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ŞİLAN YENİGÖL
Ziraat Mühendisi

Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Paft Plaza No: 6A/63
Tel: 0532 807 19 24 Çankaya/ANKARA
Çanbey V.D. 8330440694 Tic. Sic. No: 368009

08 Ocak 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi: 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Elma küllemesi: 1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğünde, 3. ve diğer Uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut karalekesi: 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde, 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. Ve diğer uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne):

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Yenidünya karalekesi: 1. Uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2. Uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce 3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4. Ve diğer uygulamalar 3'ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. 1. Uygulama: Çiçeklerin %5'i açıldığında, 2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açıldığında 3. Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100'ü açıldığında) yapılmalıdır.

Kabakgillerde küleme (Hıyar, Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün ara ile uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 270C'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ küllemesi: 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde, 3. Uygulama: Çiçek ve taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

VAPCOTOP %70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B1:1 sınıflandırılmış bir fungustir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VAPCOTOP un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B1:1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali karakterli bitki koruma ürünleri hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



VAPCOTOP

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	B1:1	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	------	----------------------------

%70 Thiophanate-methyl

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ: (UZEM) Tel: 114

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.

Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box: 17058, Amman-11195- JORDAN

Tel: 0096265694991, Faks: 009626594998

ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.

King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

Şilan YENİGÜL
Ziraat Mühendisi

VAPCO
Tarım İlaç Üretim, Pazara Dağıtım
Veterinerlik İth. İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/63
Tel: 0532 841 1924 Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No : 388009



08 Ocak 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.