

EC FERTİLİZER
MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
Mg-VAP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

% W/W
5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI:

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama Sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 Litre Suya
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, çilekvb)	İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, v.b) Soğan	4-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra tekrar	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
Kavun, Karpuz, Kabak,	Fide dikiminden hasada kadar	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, antep fıstığı vb)	Gelişme dönemi boyunca	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
Muz	Meyve olgunlaşması esnasında	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	5-6 yapraklı dönemden dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya Ayçiçeği vb)	3-4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme döneminde	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca	1-2 L (1,2-2,4 kg) /da	200-250 ml (245-300 g)

1000 ml=1220 g

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ: VAPCO VETERİNARY & AGRİCULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.

Adresi King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa /JORDAN

Tel: +962 – 6 – 5694991 Fax: +962 – 6 – 5694998

İTHALATÇI FİRMA: VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ: YAŞAMKENT MAH. 3250 CAD. 6 A 101 ÇANKAYA /ANKARA

TEL: 03122172206 -**FAX:** 03122172216

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZ.
DAĞ.VETER.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
YAŞAMKENT MH. 3250 CD.
NO:6/A 101 ÇANKAYA/ANKARA
V.NO: 8830440694