

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



EMAVAP

SUDA ERİYEĞİLEN GRANÜL (SG)

Grup	6	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin Benzoate:

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik vb.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkarın, solunum desteği gerekli olabilir. Gerekirse tıbbi destek alınınız.

Cilt Teması Sonrası: Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve ilaç değen vucut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın. (Bakınız Önlem İfadeleri P302 + P352:)

Göz Teması Halinde: Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz. (Bakınız Önlem İfadeleri P305 + P351 + P338:)

Yutulması Halinde: Hastaya, tarım ilaçlarının seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olması halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Ürün etiketi ve bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyat :

İçindekiler: Emamectin Benzoate



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyeye dozunda fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Biber (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/da (Larva)	7 gün
Biber (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/da (Larva)	7 gün
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 l su (Larva)	7 gün
Hıyar (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 l su (Larva)	7 gün
Patıcan (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 l su (Larva)	7 gün
Karanfil (Kesme Karanfil)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 l su (Larva)	--
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 l su (Larva)	
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 g/da (Larva)	21 gün
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	35 g/da. (Larva)	7 gün
Bağ	Bağ salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 g/100 l su (Larva)	7 gün
Bağ	Bağ tripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycterothrips albicornis</i> , <i>Mycterothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	50 g./100 L.su - Ergin, Larva	10 gün
ŞEFTALİ	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20g/100 l su larva	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114
GIDA VE TARIM BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ŞİLAN YENİGÜL
Ziraat Mühendisi

VAPCO
Tarım İlaç Üretim, Pazara Hazırlama, Dağıtım
Veterinerlik İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3230 Cad. Park Plaza No: 6A/63
Tel : 0532 601 19 24 Çankaya/ANKARA
Doğanbey V.D. 8800440694 Tic. Sic. No : 398009



EMAVAP

SUDA ERİYEĞİLEN GRANÜL (SG)

Grup	6	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	---	-----------------------------

%5 Emamectin Benzoate:

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Biber (sera), hıyar (sera) ve patlıcan (sera)-Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşil kurta karşı: tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı: salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamış, etkili sıcaklıklar toplamı 1.döde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.döde 520 gün-derece, 3. döde 1047 gün-derece'ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. döde çiçek tomurcuğu, 2.döde koruk, 3. döde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döde bir uygulama yapılır.

Pamukta yeşil kurta karşı: rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşil kurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulama karar verilir.

Pamuk-Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde uygulama yapılması uygundur. Zararının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla uygulama tekrarlanmalıdır.

Karanfil-Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğu mücadelede geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınmaz.

Karanfil-Yeşil kurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Bağ-Bağ tripsleri: bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Şeftali-Şeftali güvesi: Meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. İlacın etki süresi dikkate alınarak orta geçici çeşitlerde 2 ilaçlama, geçici çeşitlerde 3 ilaçlama önerilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Emavap adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Emavap'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:
17058, Amman-11195- ÜRDÜN
Tel: 0096265694991, Faks: 009626594998

ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /ÜRDÜN
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63 Çankaya /
ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16



Şilan YENİGÖL
Ziraat Mühendisi

VAPCO
Tarım İlaç Üretim Pazarlama Dağıtım
Veterinerlik Müh. İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/63
Tel : 0532 601 19 24 Çankaya/ANKARA
Doğanbey V.D. 8830140694 Tic. Sic. No : 398009

08 Ağustos 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.