

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Serî No:  
Ruhsat Tarih ve No.su:

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
BİBER	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera litoralis</i> )	100 ml / da larva	1 gün
Domates	Domates güvesi ( <i>Tuta absoluta</i> )	100 ml / da	3 gün
Domates	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	100 ml / da larva	3 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda/ken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

### KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltarak. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

31 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. N. Y. Çelik Akkoyunlu



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



# METAVAP

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grup	22B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
	240 g/l Metaflumizone	

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EKDE KULLANMAYINIZ.
- COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAMIŞ ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ İÇMEYİNİZ VE SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMIŞ KESİNLİKLE VASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı halsizlik vb.

### İLK YARDIMI TEDBİRLERİ

**Solunma Sonrası:** Temiz havaya çıkarın, solunum desteği gerekli olabilir. Gerekiirse tıbbi destek alınır.

**Gilt Teması Sonrası:** Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve ilaç değen vucut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın.

**Göz Teması Halinde:** Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz. (Bakınız Önemli İfadeleri P305 + P351+ 338)

**Yutulması Halinde:** Hastaya, tarım ilaçlarının seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olmasa halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Ürün etiketi ve bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

**AMTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktar:  
Azami per. Sağıs fiyat :  
İçindekiler: Metaflumizone



### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H319: Ciddi göz hasarına neden olur.
- H362: Anne sütüyle beslenen çocuklara zarar verebilir.
- H373: Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda organlarda hasara neden olabilir.
- H410 :Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P263: Hamilelik/emzirme süresince temasından kaçının
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durudayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P308 + P311: Maruz kalırsa ya da dokunulursa: ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekim'i arayın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına uyun

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

ŞİFAN YENİGÜL

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114 Ziraat Mühendisi

Yabancılar İçin: 0532 601 724  
Tel : 0532 601 724  
Döğröğbey V.D. 89 06 10081  
Tic. Sic. No : 3995099

Yabancılar İçin: 0532 601 724  
Tel : 0532 601 724  
Döğröğbey V.D. 89 06 10081  
Tic. Sic. No : 3995099

VAPCO TARIMI İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



## METAVAP

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grup	22B	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	-----	-----------------------------

240 g/l Metafumizone

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ÜZEM TEL: 114**

### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzaka ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile buluşık ise uygulama yapılır.

Domateste yeşil kurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlaman büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i buluşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Biberde pamuk yaprak kuruduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılımından yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** Metavap adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 22B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Metavap'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını azaltınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARŞILABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karşım yapmadan önce ön karşım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

31 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



ŞİLAN YENİGÜL  
Ziraat Mühendisi

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

### ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:  
17058, Amman-11195- JORDAN  
Tel: 0096265694991, Faks: 009626594998

### ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN  
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIMI İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelite Plaza No: 6A/ 63 Çankaya /  
ANKARA  
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

Tarım İlaç Üretimi ve Satışları A.Ş. Ltd. Şti.  
Veterinerlik Mah. 3250 Cad. Pelite Plaza No: 6A/63  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Çankaya / ANKARA  
Tel : 0312 217 22 06 Fax : 0312 217 22 16  
E-posta: vapco@vapco.com.tr Web: www.vapco.com.tr  
Ergençevler Y.D. 0830740314 Tel. Sifc. No : 3880009

ŞİLAN YENİGÜL  
Ziraat Mühendisi