

Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

ÖNEMLİDİR:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verilebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

Kullanılması: OSCAR buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

Bitki	Kontrol Edilen Yabancı Ot	Doz
Buğday ve Arpa	Arap Baklası(<i>Vaccaria pyramidata</i>)	1 gr/da
	Balıbbaba(<i>Lamium sp.</i>)	
	Düğün çiçeği(<i>Ranunculus arvensis</i>)	
	Gelincik(<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Gönül hardalı(<i>Myagrum perfoliatum</i>)	
	Kokarot(<i>Bifora radians</i>)	
	Köyğöçüren(<i>Cirsium arvense</i>)	
	Sarı ot(<i>Boreava orientalis</i>)	
	Sedef otu(<i>Buglossoides arvensis</i>)	
	Sinek kapan(<i>Silene copoidea</i>)	
	Yabani cam çiçeği(<i>Geranium tuberosum</i>)	
	Yabani çivit otu(<i>Isatis tinctoria</i>)	
	Yabani fiğ(<i>Vicia spp.</i>)	
	Yabani turp(<i>Raphanus sp.</i>)	
	Yabani hardal(<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Boynuzlu yoğurt otu(<i>Galium tricomutum</i>)	1,5 gr/da veya 1 gr/da +%0,1 yayıcı yapıştırıcı
	Tarla yapışkan otu(<i>Asperula arvensis</i>)	
	Topluğne hardalı(<i>Neslia paniculata</i>)	
	Gökbaş(<i>Centaurea depressa</i>)	

GENEL BİLGİLER:

OSCAR kökler ve yeşil akşam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otlara hassasiyetlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar Oscar'ın etkisini hızlandırırken soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. OSCAR uçuşu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

İlacın Hazırlanması:

Gerekli miktardaki OSCAR ı karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gereklidir. Tatbikat için hazırlanmış OSCAR karışımlarını ilaçta bir parçalama söz konusu olabileceğinde 24 saatten fazla bekletmeyiniz

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

OSCAR % 75 WP

Suda Dağılılabilen Granül(WG)

HERBİSİT(YABANCI OT İLACI)

%75 Tribenuron methyl

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ!

-EVDE KULLANMAYINIZ!

-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Zehirlenme Belirtileri:

Bilinen bir zehirlenme belirtisi yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İlk Yardım Önlemleri:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması halinde: Kazazedenin bilinci açık ise; ağzı su ile çalkalayınız. Tıbbi olarak önlenmedikçe kusmaya zorlamayınız. Tıbbi bakım alınız.

Gözle teması halinde : Kontak lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla çalkalayınız. Göz tahriş devam ederse ,bir uzmana başvurunuz.

Deriyle teması durumunda :Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Antidotu: Yoktur.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114



Dr. Yunus KAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
Tehlike özelliği : Çevre İçin Tehlikeli (N)
Tehlike sembolü:



ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261:Tozunu/Dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272:Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273:Çevreye verilmesinden kaçının.

P280:Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302 +P352 Deri ile temas halinde ise:Bol su ve sabun ile yıkayınız.

P321:Özel müdahale gerekli.

P333+313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale edin.

P363:Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391:Döküntüleri toplayın.

P501:İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

DEPOLAMA VE ATIKLARIN İMHASI:

Normal(serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz. Depolama veya atık imhası sırasında sulara, gıda maddelerine ve yemlere bulaştırmayınız. Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız. Ambalajını yeniden kullanmayınız. Boş ambalaj veya kullanılmayan ilacı su kaynaklardan uzak emin bir yere gömünüz. veya tavsiye edilen diğer yollarla yok ediniz. Sulara bulaştırmayınız Balıklara zehirlidir.

İlaçlama Aletlerinin Temizlenmesi :

Tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinde zarar meydana gelebileceğinden hububatta ilaçlamalarda hemen sonra ilaçlama aletlerinin tüm parçalarını;

-100 lt suya 1 lt çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) hesabıyla hazırlanan eriyik temizleyiniz.

-Bu eriyik 10 dk süreyle karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankının içinde tutulur.

-İlaçlama tankı, pompası hortum ve borusu ilaçlama meme ve süzgeçlerini çıkardıktan sonra hazırlanan eriyikle en az üç defa temizlenir.

-Meme ve süzgeçler ayrı olarak yıkanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMA :

VAPCO VETERINARY AND AGRICULTURAL PRODUCTS MFG. CO. LTD.
Po Box 17058 /Amman-11195/ÜRDÜN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK
İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.

Yaşamkent mah. 3250 cad. Pelit plaza No:6A/63 Çankaya ANKARA
Tel:0312 2172206- Faks: 0312 2172216

22 Aralık 2016

Demet KAYRETLİ
Ziraat Mühendisi
Şirket Vekili

VAPCO

Tarım İlaç Üretim Pazarlama Dağıtım
Veterinerlik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/63
Tel : 0532 601 18 24 Çankaya/ANKARA
Doğarbey V.D. 8830440694 Tic. Sic. No : 398090

Uygulama Zamanı:

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. OSCAR tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak, 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gök baş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gök baş 'ın veya 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

Aynı yerde , aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığını, ve bu bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.

Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Direnç İle İlgili Bilgi:

OSCAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan, uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişiminin geciktirmek için OSCAR'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı türlerinin dayanıklılık kazandığını ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.

Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimi olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

OSCAR'ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ :

Buğday ve arpadaki OSCAR kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

NOT: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden OSCAR'ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

FİTOTOKSİTE:

OSCAR tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARIŞILIRLIK:

Genel olarak bütün dozlarda yayıcı ve yapıştırıcı kullanılabilir. Bu OSCAR'ın bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini artırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır. OSCAR 2,4 Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMADAĞITIM VETERİNERLİK İTH.İHR.LTD.ŞTİ

OSCAR % 75 WP

Suda Dağılılabilen Granül(WG)

HERBİSİT(YABANCI OT İLACI)

%75 Tribenuron methyl

Alıcının Dikkatine –Firma Beyanı:

VAPCO TARIM bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanım şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanıma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalarda meydana gelebilir ki bunlar VAPCO TARIM 'ın kontrolü dışındadır. Bu ilacın kullanılması veya tatbikatından meydana gelebilecek direkt veya özel zararlar VAPCO TARIM hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. VAPCO TARIM bu ilacın yukarıda belirtilen gayeler dışında, ne özel bir amaç için ne de diğer başka gayeler için kullanılmasından meydana gelebilecek sonuçlar için garanti vermez.

ÜRETİCİ FİRMA :

VAPCO VETERINARY AND AGRICULTURAL PRODUCTS MFG. CO. LTD.
Po Box 17058/ Amman-11195/ÜRDÜN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK
İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.

Yaşamkent mah. 3250 cad. Pelit plaza No:6A/63 Çankaya ANKARA
Tel:0312 2172206–Faks: 0312 2172216

VAPCO
Tarım İlaç Üretim Pazarlama Dağıtım
Veterinerlik İth.İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/63
Tel : 0532 601 19 24 Çankaya/ANKARA
Doğaribey V.D. 8830/40694 Tic. Sic. No : 398009

Demet KAYRETLİ
Ziraat Mühendisi
Şirket Vekili



22 Aralık 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.