

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şartlı Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Net Miktarı: (kg veya L)
Azami Perakende Satış Fiyatı:

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR.

LTD. ŞTİ.

AZOXIFEN

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Haşat Arasındaki Süre
DOMATES (Sera)	Külleme (Leveillula taurica)	100 ml/100 l su	3 gün
PATATES	Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)	60 ml/da	14 gün
BAĞ*	Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)	75 ml/100 l su	21 gün
BAĞ*	Bağ Küllemesi (Erysiphe necator)	75 ml/100 l su	21 gün
BAĞ*	Ölükol** (Phomopsis viticola)	75 ml/100 l su	21 gün
ANTEP FİSTİĞİ	Antepfistığında karazenk (Pseudocercospora pistaciae)	100 ml /100 l su	21 gün

*Tüketicim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılınır.

** Bağda Ölükol hastalığı: Yaz ilaçlanması olarak uygulanmalıdır.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye edilen hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı geniş spektrumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes, basidiomycetes, deuteronyces ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalık başlamadan durdurur. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON:

Tavsiye edilen hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı geniş spektrumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes, basidiomycetes, deuteronyces ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalık başlamadan durdurur. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

UYGULAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini, çalıstarak tüm parçaların sağılanması sağlanır. Yıkama işlememi su kaynaklarının yakınında yapmayın.

Yıkama suyu su ve atıkları su kaynaklarına boşaltın.

YUTULMASI HALİNDE: Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rafat nefes alabileceğiniz pozisyonda olmasına sağlayın. Kusturmaya çalışın. Tibbi yardım alın.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Aşırı doza alındığında üşük hali, titreme, nefes darlığı adale kasılması.
Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir

İşlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABÜ: İD. MÜJ. T.R
02 Temmuz 2023

Şaban YENİÇİL, ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi

VAPCO
Tüm İlaç Ürünleri İhr. Ltd. Şti.
Vetelin Mah. 322. Cad. Pelt Plaza No: 24
Temsilci Mah. 322. Cad. Pelt Plaza No: 24
Doğanbey D 8830440604 Tic. Sic. No: 3

Bitki KORMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) Küleme: 1.Uygulama: Çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır. Hastalık şiddetetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Patateste erken yaprak yanığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür göremez başlamalıdır. İlkim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etkili süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

BAĞ MILDİYÖ: İlk uygulama ya surğular 25-30 cm ulasınca başlamalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalık gelişime durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.Uygulama: Çiçekten önce sürgüler 25-30 cm olduğu dönemde

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tonnuruklarının ayrıldığı dönemde

3.Uygulama: Çiçek taş yaprakların döküldüğü ve korukların küçük sağma iringinde olduğu dönemde

4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etkili süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKÖL: Yaz uygulaması:

1.Uygulama: sübgünler 2-3 cm olduğunda

2.Uygulama: sübgünler 8-10 cm olduğunda

3.Uygulama: sürgüler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Antepfişliğinde Karazen: 1.iğlama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enteksyonlardan önce, yaprakların açılmasına başladığ döndeme; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iringinde ve yapraklar tam olarak açtı döndeme yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döndeme kadar uygulama yapılabilir.

2. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların özellikle, etkili süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Azoxifen adlı bitki koruma ürünü, etkili mekanizmasına göre **Grup C3:11 ve G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Azoxifen'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C3:11 ve G1:3** haric) bitki koruma ürünlerini kullanılmamasına özen gösteriniz.

KARŞABILIRLIK DURUMU:

Karşıtılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bitki koruma ürününü rühsat sahibi firmasına başvurunuz.

TARIM VE ORGAN BAKANLIĞI
TARIM VE ORGAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL İNSTITÜTÜ
www.tubitak.gov.tr

Şaban YENIGUL ERDOĞAN

VaPco
Tarım İlaç Üretimi ve Satışına Dağıtım
Vetfarm İhracatı İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A Blok No: 6 - A / 63 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

Tel: 0332 611924 Çankaya/ANKARA
Cephanbay ID: 68330440694 Tel/Sic: No: 359409

**VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.****AZOXIFEN**

Grubu	C3:11	G1:3	FUNGİSİ (Mantar ilaç)
-------	-------	------	-----------------------

200 g/l Azoxystrobin +125 g/l Difenoconazole**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR:**

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapali olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayın.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılar zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun koşullarda depolanması, hatallı tatbiki veya taşıye dışı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD. Shmeisan, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box: 17058, Amman-11195-JORDAN

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD. King Hussein Street, Al-Dhulail Area, A-Zarqa /JORDAN

RÜHSAT SAHİBİ FIRMA:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A Blok No: 6 - A / 63 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

Cilt ile teması halinde: Kirleme tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Kazazedevi kirleme kaynağından uzaklaştırın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklılığı iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin Gözlerinizi ovmayı. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTU VE TEDAVİSİ:
Belirli bir antidottu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

