

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

31.03.2023/12739

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ELMA	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	40 gr /100 L su	28 gün
KAYISI	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	30 gr /100 L su	7 gün
ARMUT	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	40 gr /100 L su	28 gün
ŞEFTALİ	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	30 g / 100 L su	7 gün
BAG*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g/ 100 L su	7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünün aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini, çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

VAPNİL

WG (Suda Dağılabilen Granül)

Grubu	D1;9	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	----------------------------

%50 Cyprodinil

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLAMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA, 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale kaspılması. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Kusturmaya çalışın. Tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin Gözlerinizi ovmayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

Net Miktarı: (kg veya L)
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER: Cyprodinil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H) :

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

31 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Mesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ŞİLAN YENİGÜL ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi

Tarım İlaç Üretim Pazarlama Dağıtım
Veterinerlik İth. İhr. Ltd. Şti.
Çankaya Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/63
Tel : 0532 601 49 24 - Çankaya/ANKARA
Doğanbey V.D. 8830440694 Tic. Sic. No : 398009

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**Elma Karalekesi:**

1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısı ,Şeftali Çiçek Monilyası:

1. İlaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. İlaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100).

Armut Karalekesi:

1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. İlaçlama: Beyaz rozet döneminde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bağ – Kurşuni küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birinci uygulama tanelerin olgunluk başlangıcında yapılır. İkinci ve diğer uygulamalar kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde birinci uygulama çiçeklenmeden hemen önce yapılır. İkinci uygulama kapalı salkım döneminde yapılır. Üçüncü ve diğer uygulamalar kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

VAPNİL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup D1;9** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **VAPNİL** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup D1;9 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırmadan tek başına kullanınız. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

31 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

VAPNİL

WG (Suda Dağılabilen Granül)

Grubu	D1;9	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	----------------------------

%50 Cyprodinil

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:
17058, Amman-11195- ÜRDÜN
Tel: 0096265694991, Faks: 009626594998

ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /ÜRDÜN
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16



ŞİLAN YENİGÜL ERDOĞAN
Ziraat Mühendisi

VAPCO
Tarım İlaç Üretim Pazarlama Dağıtım
Veterinerlik İth. İhr. Ltd. Şti.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/6
Tel: 0532 681 19 24 Çankaya/ANKARA
Doğanbey Y.D: 8830449694 Tic. Sic. No: 3986